




Poster: Schock 2



Hauptursache Volumenverlust: Hypovolämischen Schock behandeln

- gegebenenfalls kritische Blutung stillen
- [Notarzt rufen](#)
- [Schocklage herstellen](#)
- [Infusion vorbereiten, anreichen und sichern](#)
- nach Aufforderung durch Notarzt [Injektion vorbereiten und anreichen](#)

Hauptursache Volumenverschiebung: Distributiven Schock behandeln

- [Notarzt rufen](#)
- Septischer Schock: [Schocklage herstellen](#)
- Anaphylaktischer und Anaphylaktoider Schock: [Schocklage herstellen](#)
- Neurogener Schock: [Rückenlage - Wirbelsäulenverletzung herstellen](#)
- [Infusion vorbereiten, anreichen und sichern](#)
- nach Aufforderung durch Notarzt [Injektion vorbereiten und anreichen](#)

Hauptursache Herzschwäche: Kardiogenen Schock behandeln

- [Notarzt rufen](#)
- [Rückenlage - Atemnot herstellen](#)
- [Infusion vorbereiten, anreichen und sichern](#)
- nach Aufforderung durch Notarzt [Injektion vorbereiten und anreichen](#)

Hauptursache Kreislaufblockade: Obstruktiven Schock behandeln

- [Notarzt rufen](#)
- [Rückenlage - Standard herstellen](#)
- [Infusion vorbereiten, anreichen und sichern](#)
- nach Aufforderung durch Notarzt [Injektion vorbereiten und anreichen](#)